



К'які

Середньопізній сорт,
придатний до харчових цілей, без ГМО




ОЗНАКА	ПОКАЗНИК
Група стиглості	1- (0.6)
К-сть теплових одиниць (CHU), ОС	2800
Вегетаційний період (дні)	115-120 днів
Вміст білка в перерахунку на суху речовину, %	41-42%
Вміст олії, %	21-22%
Висота рослини (бали 1-5)	3,6 середньовисока (100см)
Висота кріплення нижнього бобу, см	Висока (14-16см)
Маса тисячі насінин	170-210 гр
Основне забарвлення оболонки насінини	Світле
Колір рубчика	Білий
Колір квітки	Білий
Колір опушення	Жовто-коричневий
Форма листків	Загострено яйцеподібна
Гілкування	Середнє
Форма насінини	Куляста



К'які

Форма насінини - куляста
Рубчик Білий

Потенціал врожайності - 4,5 т/га



Рекомендації з посіву

Ширина міжряддя	19-30 см
Рекомендована густота	500-550 тис схожих нас/га

Агрономічні характеристики (1-9 бал)

Енергія початкового росту	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7	
Стійкість до вилягання	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9
Стійкість до осипання	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9
Стійкість до посухи	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9
Стійкість до розтріскування	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9
Стійкість до склеротиніозу	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8	
Стійкість до гербіцидів	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

стійкий до метрибузину